



Candidato:

Prova Escrita – Acesso Direto

28|02|2020

QUESTÃO 01 – Qual é o patógeno mais comumente envolvido na artrite séptica em crianças?

- A) *Haemophilus influenzae*.
- B) *Staphylococcus aureus*.
- C) *Escherichia coli*.
- D) *Mycoplasma pneumoniae*.
- E) *Chlamydia trachomatis*.

QUESTÃO 02 - Uma criança que estava assintomática, passa a apresentar quadro clínico de coma, intensa miose, depressão respiratória, hipotensão, bradicardia e hiporreflexia. Considerando a hipótese de intoxicação, qual das substâncias abaixo é a mais provável?

- A) Opióide.
- B) Difenidramina.
- C) Organofosforado.
- D) Cocaína.
- E) Solvente orgânico

QUESTÃO 03 - Na criança de idade escolar, o patógeno mais provável na pneumonia bacteriana é

- A) *Chlamydia trachomatis*.
- B) *Staphylococcus aureus*.
- C) *Streptococcus pneumoniae*
- D) *Neisseria meningitidis*.
- E) *Haemophilus influenzae*.

QUESTÃO 04 - Qual dos exames de imagem referidos abaixo deve ser rotineiramente indicado num recém-nascido com suspeita de Síndrome de Down?

- A) Ultrassonografia de crânio.
- B) Ultrassonografia renal.
- C) Ultrassonografia hepática
- D) Ecocardiograma.
- E) Tomografia Computadorizada abdominal.

QUESTÃO 05 – A infecção por *Chlamydia trachomatis* adquirida pelo recém-nascido durante sua passagem pelo canal do parto, se manifestará com maior probabilidade através de

- A) pneumonia.
- B) meningite.
- C) conjuntivite.
- D) dermatite.
- E) Mastite.

QUESTÃO 06 – Qual é o patógeno mais comumente responsável por infecção do trato urinário em meninas adolescentes?

- A) *Gardnerella vaginalis*.
- B) *Staphylococcus saprophyticus*.
- C) *Escherichia coli*.
- D) *Moraxella catarrhalis*.
- E) *Haemophilus influenzae*.

QUESTÃO 07 – Sobre a infecção pelo vírus HIV e a epidemia da AIDS é possível afirmar:

- I. No Brasil houve recentemente uma nova fase de feminilização da epidemia, sendo um evento incomum infecções em homens, e decrescente a incidência de infecções entre homens que praticam sexo com outros homens.
- II. A história natural da doença é igual para todas as pessoas que vivem com o vírus HIV não havendo diferentes velocidades de progressão da doença.
- III. O critério mais importante no monitoramento do tratamento é a supressão viral obtida por carga viral do HIV indetectável.
- IV. Médicos não devem ofertar exames de teste de HIV para indivíduos assintomáticos, uma vez que diagnosticar precocemente a infecção não trará nenhum impacto de sobrevida desses pacientes.

São corretas as afirmativas:

- A) I e II
- B) I, II e III
- C) II e III
- D) Somente a III
- E) I, II, III e IV

QUESTÃO 08 – Sobre a Hepatite C (HCV) assinale a alternativa INCORRETA:

- A) Embora em mais de 50% das infecções a origem seja desconhecida, as formas mais comuns de transmissão são o uso compartilhado de drogas injetáveis e materiais cortantes contaminados, além de acidentes ocupacionais, tatuagens contaminadas, e histórico prévio de transfusão sanguínea.
- B) Daqueles indivíduos que entraram em contato com o vírus, menos de 20% apresentarão cronicidade da doença, ou seja, a grande maioria não evoluirá para forma crônica da infecção.
- C) Cada vez mais tem sido orientado que médicos ofereçam teste de HCV universalmente, visando ampliar a capacidade diagnóstica e tratamentos;
- D) Um teste de anti-HCV reagente não é suficiente para diagnosticar definitivamente a cronicidade da doença, devendo ser complementado por um teste molecular (PCR RNA para HCV)
- E) A elastografia hepática é um método importante, não invasivo, e cada vez mais útil, uma vez que permite estadiar o grau de fibrose hepática e desta maneira determinar tempo de tratamento e plano de rastreamento de hepatocarcinoma, em especial naqueles pacientes com fibrose avançada (F3 ou F4).

3

QUESTÃO 09 – Marque a alternativa correta:

- A) Linfonodomegalia supra-clavicular esquerda é chamado de Nódulo da Irmã Maria-José
- B) Tumoração peri-umbelical é chamada de Tumor de Krukemberg
- C) Linfonodomegalia supra-clavicular esquerda é chamada de Nódulo de Krukemberg
- D) A extensão da linfadenectomia realizada no tratamento cirúrgico do câncer gástrico comprovadamente influencia no resultado do tratamento.
- E) Em pacientes sem metástases à distância, apenas a ressecção do tumor primário de câncer de cólon é suficiente, não sendo necessário a avaliação linfonodal.

QUESTÃO 10 – Com relação ao Tumor de Pulmão é INCORRETO afirmar que:

- A) 80% dos casos estão relacionados ao tabagismo e os tabagistas apresentam um risco de 20-30 vezes maior.
- B) Com relação a abordagem terapêutica, eles são agrupados em dois grandes grupos: Pequenas Células e Não-pequenas células.
- C) A Síndrome de Claude Bernard-Horner pode ser uma das formas de apresentação de tumores de pulmão localizados no ápice pulmonar (tumor de Pancoast), ocorrendo miose, ptose palpebral, anidrose facial e enoftalmia.
- D) O sub-tipo carcinoma de células escamosas está dentro do grupo não-pequenas células.

- E) O sub-tipo Adenocarcinoma está dentro do grupo não-pequenas células, enquanto que o carcinoma de células escamosas está no grupo de pequenas células.

QUESTÃO 11 – Quais situações clínicas cursam com elevação do número de reticulócitos?

- A) Anemias hemolíticas e anemia da insuficiência renal crônica
- B) Anemia ferropriva e anemia aplástica
- C) Anemia aplástica e anemias hemolíticas
- D) Anemia de doença crônica e anemia aplástica
- E) Anemias hemolíticas e recuperação medular pós-sangramento

QUESTÃO 12 – Paciente de 35 anos, feminina, apresenta-se na emergência com quadro de febre, desorientação e oligúria, com início há dois dias. Exames mostram anemia, presença de esquizócitos em lâmina de sangue periférico (hemácias fragmentadas), contagem plaquetária de 7.000/ mm³, confirmada pela observação em lâmina, e aumento de desidrogenase láctica. O diagnóstico mais provável é:

- A) Hemofilia B
- B) Pseudoplaquetopenia
- C) Deficiência de vitamina B12
- D) Púrpura trombocitopênica trombótica
- E) Púrpura trombocitopênica imune

QUESTÃO 13. Representa fator de risco para osteoporose em mulheres:

- A) hiperprolactinemia.
- B) obesidade.
- C) glaucoma.
- D) hipertireoidismo
- E) raça negra

4

QUESTÃO 14. Sobre as principais vulvovaginites, considere as assertivas abaixo.

- I. Vaginose bacteriana está relacionada com Ph vaginal < 4,5 e teste das aminas positivo.
- II. Hidróxido de potássio é útil para a realização do exame a fresco em caso de vulvovaginite micótica.
- III. O uso de dispositivo intrauterino pode estar associado à presença de *Actinomyces* ao exame citopatológico de colúterino.

Quais são corretas?

- A) Apenas I
- B) Apenas II
- C) Apenas III
- D) Apenas II e III
- E) I, II e III

QUESTÃO 15. Segundo a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetria (FIGO), o estadiamento do câncer de colo uterino é

- A) clínico.
- B) por imagem.

- C) cirúrgico (cirurgia laparoscópica).
- D) cirúrgico (cirurgia aberta).
- E) clínico e por imagem

QUESTÃO 16. Principal agente etiológico encontrado na mastite puerperal:

- A) *Salmonella sp*
- B) *Stafilococcus aureus*
- C) micobactérias.
- D) *Criptococos*
- E) *Enterobacter sp.*

QUESTÃO 17. Sobre miomas uterinos, assinale a assertiva **incorreta**.

- A) O crescimento uterino isolado não é uma indicação cirúrgica.
- B) A embolização das artérias uterinas pode ser indicada para pacientes nulíparas com miomatose sintomática que desejam engravidar.
- C) Há uma influência genética na gênese dos miomas.
- D) Idade superior a 40 anos aumenta expressivamente a chance de a mulher apresentar algum grau de miomatose
- E) Os miomas pediculados não constituem isoladamente indicação cirúrgica.

QUESTÃO 18. Em relação à pré-eclâmpsia é correto afirmar:

- A) Mulheres pré-eclâmpicas apresentam sensibilidade diminuída a angiotensina II, mesmo antes das manifestações clínicas.
- B) Observam-se pequenas alterações no débito cardíaco, sendo o aumento na pressão arterial dependente principalmente da elevação na resistência vascular periférica.
- C) A fisiopatologia vascular da pré-eclâmpsia não modifica as alterações fisiológicas próprias da gravidez normal
- D) Não existem evidências morfológicas e/ou bioquímicas de que a pré-eclâmpsia é precedida e/ou acompanhada por dano endotelial
- E) A lesão renal da pré-eclâmpsia pode ser responsável pelo aumento da filtração glomerular e do clearance de ácido úrico, o último causando a característica hiperuricemia.

5

QUESTÃO 19 – O divertículo de Meckel:

- A) é um falso divertículo
- B) é assintomático na maioria dos casos
- C) comumente se apresenta como sangramento gastrointestinal em adultos
- D) comumente se apresenta com obstrução intestinal em crianças
- E) é encontrado em aproximadamente 5-10% da população

QUESTÃO 20 – A neoplasia maligna do intestino delgado geralmente se apresenta com:

- A) emagrecimento
- B) dor abdominal
- C) sangramento gastrointestinal
- D) icterícia
- E) perfuração intestinal

QUESTÃO 21 – A causa mais comum de morte relacionada ao cateterismo venoso central é

- A) embolia gasosa
- B) perfuração de veia central

- C) pneumotórax hipertensivo
- D) embolia do próprio cateter
- E) sepse relacionada ao cateter

QUESTÃO 22 – Das medicações abaixo, qual não deve ter seu uso suspenso antes de uma cirurgia eletiva?

- A) Varfarina
- B) Clopidogrel
- C) Marevan
- D) Atenolol
- E) Heparina

QUESTÃO 23 – Qual a complicação mais comum da úlcera gástrica?

- A) Transformação maligna
- B) Perfuração
- C) Sangramento gastrointestinal
- D) Obstrução gástrica
- E) Gastroparesia

QUESTÃO 24 – Dos fatores abaixo, qual o mais comumente relacionado à etiologia dos aneurismas de aorta?

- A) Sífilis
- B) Salmonelose
- C) Aterosclerose
- D) *Diabetes mellitus*
- E) Hipertensão arterial sistêmica

6

QUESTÃO 25 – Mulher, 24 anos, procura atendimento devido exacerbação de acne. Informa ciclos irregulares, com até 4 meses em amenorréia, e secreção mamilar à direita. Nega uso de medicações. Afastada possibilidade de gravidez. A hipótese diagnóstica é acne secundária a distúrbios hormonais. Analisando o caso em questão, quais as condições clínicas que mais provavelmente podem estar associadas a esta hipótese diagnóstica?

- A) Síndrome dos Ovários Policísticos e Hiperprolactinemia
- B) Hiperplasia suprarrenal congênita de início tardio e Síndrome de Cushing
- C) Acromegalia e Hiperplasia suprarrenal congênita de início tardio
- D) Síndrome dos Ovários Policísticos e Diabetes mellitus
- E) Hiperplasia suprarrenal congênita de início tardio e Hipotireoidismo

QUESTÃO 26 – Homem, 82 anos, hipertenso, diabético, com histórico de colocação de 2 stents aos 71 anos. Retorna à consulta com na unidade básica de família relatando respiração difícil, com sensação de incapacidade de respirar rápido ou profundamente, com evolução de aproximadamente 4 meses. Diz não conseguir “encher os pulmões”. A dispnéia passou a ser observada em esforços habituais. Nega febre ou tosse produtiva. Nega hemoptise e dor torácica. Nega emagrecimento. Não fumante. Ao exame físico encontra-se corado, com turgência jugular a 45°, desvio do *ictus cordis* e edema de membros inferiores.

Qual a hipótese diagnóstica mais provável neste caso?

- A) DPOC
- B) Descompensação do Diabetes mellitus
- C) Câncer de pulmão
- D) Anemia
- E) Insuficiência cardíaca

QUESTÃO 27 – Mulher, 42 anos, procura atendimento na equipe de saúde da família devido a observação de familiares que seu rosto estava desviando para o lado direito há algumas horas. Ao ser questionada, informa que há dois dias apresentou otalgia com hiperacusia na sequência, sem perda auditiva. Relata dormência na orelha do mesmo lado e “gosto ruim na boca”. Qual a hipótese diagnóstica mais provável no caso descrito?

- A) Esclerose múltipla
- B) Neurinoma do acústico
- C) Meningioma
- D) Caxumba
- E) Paralisia de Bell

QUESTÃO 28 – Mulher, 90 anos, procura atendimento na UBS, por orientação de vizinhos, devido insistentes afirmações de ter apresentado nove derrames nos últimos cinco anos. Os relatos eram atribuídos a algum processo de demência devido à idade. Porém um dos episódios foi presenciado por casal de vizinhos. Relataram alteração na fala e visão, perda de força no braço e na perna direitos e a queixa de dor de cabeça. Voltou à normalidade após 15 minutos. Qual a hipótese diagnóstica mais provável?

- A) Acidente vascular cerebral isquêmico
- B) Ataque isquêmico transitório
- C) Acidente vascular cerebral hemorrágico
- D) Labirintopatia
- E) Síndrome de Ménière

QUESTÃO 29 – Sobre os objetivos da síntese de evidências para políticas de saúde, defina como V para verdadeiro e F para falso nas afirmações a seguir.

- () Melhorar as práticas de gestão no sistema de saúde
- () Aprimorar a escolha baseada na relação de custo/benefício e custo/efetividade.
- () Aumentar a abrangência e aprofundamento das políticas públicas endereçadas a problemas de saúde relevantes.

Marque a alternativa que contenha a sequência correta de cima para baixo

- A) F – V – V
- B) F – F – F
- C) V – F – V
- D) V – V – F
- E) V – V – V

QUESTÃO 30 – Marque a alternativa que contenha o principal problema na demanda de atendimento/consulta médica em Atenção Primária no Brasil.

- A) Cefaléia
- B) Hipertensão arterial não complicada
- C) Asma
- D) Dores musculares
- E) Úlcera gástrica