



Candidato:

Prova Escrita – Pré-Requisito para MEDICINA INTENSIVA

28|02|2020

QUESTÃO 01 – Qual é o patógeno mais comumente envolvido na artrite séptica?

- A) *Haemophilus influenzae*.
- B) *Staphylococcus aureus*.
- C) *Escherichia coli*.
- D) *Mycoplasma pneumoniae*.
- E) *Chlamydia trachomatis*.

QUESTÃO 02 – Sobre a infecção pelo vírus HIV e a epidemia da AIDS é possível afirmar:

- I. No Brasil houve recentemente uma nova fase de feminilização da epidemia, sendo um evento incomum infecções em homens, e decrescente a incidência de infecções entre homens que praticam sexo com outros homens.
- II. A história natural da doença é igual para todas as pessoas que vivem com o vírus HIV não havendo diferentes velocidades de progressão da doença.
- III. O critério mais importante no monitoramento do tratamento é a supressão viral obtida por carga viral do HIV indetectável.
- IV. Médicos não devem ofertar exames de testagem de HIV para indivíduos assintomáticos, uma vez que diagnosticar precocemente a infecção não trará nenhum impacto de sobrevida desses pacientes.

São corretas as afirmativas:

- A) I e II
- B) I, II e III
- C) II e III
- D) Somente a III
- E) I, II, III e IV

QUESTÃO 03 – Sobre a Hepatite C (HCV) assinale a alternativa INCORRETA:

- A) Embora em mais de 50% das infecções a origem seja desconhecida, as formas mais comuns de transmissão são o uso compartilhado de drogas injetáveis e materiais cortantes contaminados, além de acidentes ocupacionais, tatuagens contaminadas, e histórico prévio de transfusão sanguínea.
- B) Daqueles indivíduos que entraram em contato com o vírus, menos de 20% apresentarão cronicidade da doença, ou seja, a grande maioria não evoluirá para forma crônica da infecção.
- C) Cada vez mais tem sido orientado que médicos ofereçam testagem de HCV universalmente, visando ampliar a capacidade diagnóstica e tratamentos;
- D) Um teste de anti-HCV reagente não é suficiente para diagnosticar definitivamente a cronicidade da doença, devendo ser complementado por um teste molecular (PCR RNA para HCV)
- E) A elastografia hepática é um método importante, não invasivo, e cada vez mais útil, uma vez que permite estadiar o grau de fibrose hepática e desta maneira determinar tempo de tratamento e plano de rastreamento de hepatocarcinoma, em especial naqueles pacientes com fibrose avançada (F3 ou F4).

QUESTÃO 04 – Marque a alternativa correta:

- A) Linfonodomegalia supra-clavicular esquerda é chamado de Nódulo da Irmã Maria-José
- B) Tumoração peri-umbelical é chamada de Tumor de Krukemberg
- C) Linfonodomegalia supra-clavicular esquerda é chamada de Nódulo de Krukemberg
- D) A extensão da linfadectomia realizada no tratamento cirúrgico do câncer gástrico comprovadamente influencia no resultado do tratamento.
- E) Em pacientes sem metástases à distância, apenas a ressecção do tumor primário de câncer de cólon é suficiente, não sendo necessário a avaliação linfonodal.

QUESTÃO 05 – Com relação ao Tumor de Pulmão é INCORRETO afirmar que:

- A) 80% dos casos estão relacionados ao tabagismo e os tabagistas apresentam um risco de 20-30 vezes maior.
- B) Com relação a abordagem terapêutica, eles são agrupados em dois grandes grupos: Pequenas Células e Não-pequenas células.
- C) A Síndrome de Claude Bernard-Horner pode ser uma das formas de apresentação de tumores de pulmão localizados no ápice pulmonar (tumor de Pancoast), ocorrendo miose, ptose papebral, anidrose facial e enoftalmia.
- D) O sub-tipo carcinoma de células escamosas está dentro do grupo não-pequenas células.
- E) O sub-tipo Adenocarcinoma está dentro do grupo não-pequenas células, enquanto que o carcinoma de células escamosas está no grupo de pequenas células.

QUESTÃO 06 – Quais situações clínicas cursam com elevação do número de reticulócitos?

- A) Anemias hemolíticas e anemia da insuficiência renal crônica
- B) Anemia ferropriva e anemia aplástica
- C) Anemia aplástica e anemias hemolíticas
- D) Anemia de doença crônica e anemia aplástica
- E) Anemias hemolíticas e recuperação medular pós-sangramento

QUESTÃO 07 – Paciente de 35 anos, feminina, apresenta-se na emergência com quadro de febre, desorientação e oligúria, com início há dois dias. Exames mostram anemia, presença de esquizócitos em lâmina de sangue periférico (hemácias fragmentadas), contagem plaquetária de 7.000/ mm³, confirmada pela observação em lâmina, e aumento de desidrogenase láctica. O diagnóstico mais provável é:

- A) Hemofilia B
- B) Pseudoplaquetopenia
- C) Deficiência de vitamina B12
- D) Púrpura trombocitopênica trombótica
- E) Púrpura trombocitopênica imune

3

QUESTÃO 08 – Tromboembolia pulmonar (TEP) é caracterizada pela obstrução da artéria pulmonar ou um de seus ramos. A gravidade da doença é variável, dependendo da extensão com comprometimento do leito vascular, bem como do shunt ventilação perfusão gerado. Os sintomas de apresentação da doença são amplamente inespecíficos, e neste contexto, o diagnóstico correto torna-se imprescindível, já que a mortalidade da doença não tratada pode chegar a 30% dos casos. Os D-Dímeros são produtos da degradação da fibrina liberados na corrente sanguínea pela fibrinólise endógena e a utilidade da sua dosagem na suspeita de TEP é

- A) se positivo, confirma o diagnóstico de TEP em pacientes com alta probabilidade
- B) se positivo, confirma o diagnóstico de TEP em pacientes com probabilidade intermediária e alta
- C) se positivo, confirma o diagnóstico, independente da probabilidade clínica
- D) se negativo, exclui o diagnóstico, independente da probabilidade clínica
- E) se negativo, exclui o diagnóstico de TEP em pacientes com baixa probabilidade

QUESTÃO 09 - Um paciente que estava assintomática, passa a apresentar quadro clínico de coma, intensa miose, depressão respiratória, hipotensão, bradicardia e hiporreflexia. Considerando a hipótese de intoxicação, qual das substâncias abaixo é a mais provável?

- A) Opióide.
- B) Difenidramina.
- C) Organofosforado.
- D) Cocaína.

E) Solvente orgânico

QUESTÃO 10 – São pares adequados, substância e antídoto, para o tratamento das intoxicações.

- I. Opiáceos e naloxona.
- II. Benzodiazepínicos e flumazenil.
- III. Ferro e deferoxamina.
- IV. Metanol e etanol.

Estão corretas:

- A) I e II.
- B) I e III
- C) II e III.
- D) I, II e III.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 11 – Os critérios diagnósticos para intoxicação por álcool são baseados em evidências de ingestão recente de etanol, comportamento desadaptativo e alguns correlatos fisiológicos. Dentre os sinais de intoxicação por álcool descritos abaixo, assinale a única opção INCORRETA:

- A) Alucinações visuais
- B) Nistagmo
- C) Visão dupla
- D) Fala arrastada
- E) Vômito

QUESTÃO 12 – Durante a fase de ressuscitação, o uso do algoritmo ABC do ATLS é mandatório. Qual das causas abaixo altera primariamente o item B (Breathing) dessa rotina?

- A) Obstrução de via aérea
- B) Pneumotórax hipertensivo
- C) Lesão da aorta
- D) Fratura da sexta vértebra cervical.
- E) Imobilização cervical

QUESTÃO 13 – Dos fatores associados a trombose venosa profunda e embolia de pulmão, abaixo citados, o de MAIOR risco é

- A) insuficiência cardíaca congestiva.
- B) restrição ao leito por mais de 48 horas.
- C) uso de contraceptivo oral.
- D) síndrome nefrótica.
- E) diálise crônica.

QUESTÃO 14 - Paciente adulto jovem, agendado para cirurgia ambulatorial, sob anestesia geral, informa que há três horas aproximadamente tomou água equivalente a meio copo. O anestesilogista deve:

- A) suspender a cirurgia
- B) usar antiemético (metoclopramida) e induzir a anestesia nos 30 minutos seguintes
- C) desconsiderar as precauções do jejum e induzir a anestesia
- D) retardar o início da anestesia por três horas
- E) usar a manobra de Sellick durante a indução da anestesia

QUESTÃO 15 - Os sintomas ou sinais que podem indicar intoxicação por lidocaína são:

- (A) cefaléia, diplopia e sensação de dormência na orofaringe.
- (B) alterações psicomotoras, taquicardia e parada respiratória.
- (C) hipoglicemia e choque neurogênico.
- (D) alterações neurológicas com excitação ou depressão, incoordenação motora e convulsão.
- (E) arritmia cardíaca, sialorréia e midríase.