



Candidato:

Prova Escrita – Pré-Requisito PSIQUIATRIA

28|02|2020

1. As principais características clínicas do Transtorno de Personalidade Borderline são:

- A) Dramaticidade, superficialidade de afeto, comportamento sedutor, manipulação, sintomas conversivos e/ou dissociativos.
- B) Impulsividade, instabilidade de autoimagem, oscilações de humor que compreendem depressão e mania, sentimentos crônicos de vazio e alucinações visuais e auditivas.
- C) Pensamentos paranoides, alucinações auditivas, tentativas de suicídio, agressividade, maneirismos e catatonia.
- D) Impulsividade, compras compulsivas, hipersexualidade, agressividade, tentativas de suicídio, humor exaltado e loquacidade.
- E) Impulsividade, instabilidade de autoimagem, sentimentos crônicos de vazio, tentativas recorrentes de suicídio, incapacidade de tolerar o abandono e ideação paranoide transitória.

2. Com relação à abordagem do paciente com risco suicida, é correto afirmar:

- A) Não se deve perguntar sobre suicídio durante a entrevista, porque isso pode induzir o paciente a uma tentativa.
- B) A comunicação de ideação suicida pelo paciente normalmente é uma maneira de obter atenção da família, ou uma tentativa de manipular o profissional de saúde para obter um ganho, não devendo ser considerada.
- C) A internação é necessária sempre que um paciente comunica a ideação suicida.
- D) Pacientes psicóticos, com vozes de comando, gravemente deprimidos, com tentativa prévia violenta, com plano de suicídio, e/ou com fraco suporte social devem seguir tratamento ambulatorial intensivo, mas habitualmente não necessitam de internação.
- E) A internação hospitalar deverá ser considerada em um paciente com plano suicida, levando-se em consideração a avaliação diagnóstica e situacional, observando fatores predisponentes, precipitantes e protetores para uma tentativa de suicídio.

2

3. São mecanismos de defesa comumente encontrados em pacientes obsessivos:

- A) Racionalização, altruísmo e humor
- B) Intelectualização, racionalização e bloqueio emocional
- C) Identificação, sublimação e ascetismo
- D) Identificação projetiva, atuação, cisão
- E) Identificação projetiva, somatização e sublimação

4. Marque a alternativa INCORRETA:

- A) O transtorno do pânico caracteriza-se pela recorrência de "ataques de pânico" de espontâneos (um exemplo é o ataque de pânico noturno), mas com a evolução do quadro é comum que os pacientes passem a ter ataques de pânico desencadeados por situações específicas.
- B) Um ataque de pânico pode ocorrer em decorrência do uso de drogas, como, por exemplo, maconha ou cocaína.
- C) Todo o indivíduo que apresenta ataques de pânico é diagnosticado com transtorno do pânico.
- D) Alguns pacientes que estão tendo um ataque de pânico acham que podem estar tendo um infarto, já que durante o ataque o paciente pode apresentar dor no peito, taquicardia e dispneia.
- E) Alguns pacientes com transtorno do pânico podem desenvolver Agorafobia.

5. É uma INDICAÇÃO para Psicoterapia Breve (Focal):

- A) Crise vital (p.ex. casamento, menopausa, etc.)
- B) Transtorno de uso de substâncias.
- C) Psicopatia
- D) Transtorno de personalidade
- E) Transtorno psicótico breve

6. Marque a alternativa INCORRETA:

- A) A compreensão do paciente na Psicoterapia de Apoio pode ser a mesma que na Psicoterapia de Orientação Psicanalítica, mas as intervenções são menos confrontadoras, como a psicoeducação, sugestão e validação empática.
- B) Segundo a teoria psicanalítica, os conflitos infantis inconscientes tendem a se repetir na vida adulta.
- C) A Psicanálise está indicada no tratamento das neuroses e transtornos de personalidade, desde que estes não sejam severos.
- D) A Psicoterapia de Orientação Psicanalítica difere da Psicanálise por utilizar fundamentos teóricos distintos.
- E) Para lidar com a ansiedade decorrente dos conflitos inconscientes, o ego se utiliza de mecanismos de defesa mais ou menos evoluídos.

7. Relacione o mecanismo de defesa com a sua descrição.

- I. Cisão
- II. Racionalização
- III. Sublimação

- a. A pessoa utiliza-se de uma explicação racional para os sentimentos, evitando assim o afeto relacionado.
- b. O ego consegue dar vazão à pulsão ao transformá-la em algo produtivo e adaptado.
- c. Divisão do self e/ou dos objetos em dois aspectos: bom e mau, que não são integrados.

A sequência correta é:

- A) Ia, IIb, IIIc.
- B) Ib, IIc, IIIa.
- C) Ic, IIa, IIIb.
- D) Ia, IIc, IIIb.
- E) Ic, IIb, IIIa.

8. Sobre a teoria psicanalítica clássica, considere as seguintes assertivas:

- I. A pulsão de vida está relacionada ao instinto de sobrevivência e ao investimento da libido (catexia).
- II. A ansiedade realista está sempre relacionada ao medo de que os instintos escapem do controle.
- III. A pulsão de morte representa o desinvestimento da libido, agressividade e destruição.

Está(ão) CORRETA(s):

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.

-
- D) I e II, apenas.
E) I e III, apenas.

9. Utilizando o modelo topográfico de Freud, relacione as características com o domínio.

- I. Pensamentos e emoções percebidas.
- II. Memórias que podem ser lembradas e conhecimento adquirido.
- III. Desejos inaceitáveis que o indivíduo não percebe e memórias reprimidas.

- a. Consciente
- b. Pré-consciente.
- c. Inconsciente.

A sequência correta é:

- A) Ia, IIb, IIIc.
- B) Ia, IIc, IIIb.
- C) Ib, IIa, IIIc.
- D) Ib, IIc, IIIa.
- E) Ic, IIa, IIIc.

10. São termos relacionados ao inconsciente, EXCETO:

- A) Deslocamento.
- B) Simbolização.
- C) Ilógico.
- D) Processo secundário.
- E) Atemporal.

4

11. Analise o caso clínico:

Paciente de 21 anos chega à consulta psiquiátrica relatando que há cerca de um ano tem apresentado dificuldades para sair de casa pois precisa checar três vezes todas as portas e janelas, senão algo ruim pode acontecer com ela. Além disso, não se alimenta no refeitório da faculdade porque acha que os alimentos e os talheres podem estar contaminados e apresenta pensamentos intrusivos recorrentes de que irá contrair HIV se usar o banheiro da universidade, mas consegue afastar esse pensamento se lavar as mãos nove vezes. A paciente pede ajuda porque está se afastando dos amigos e o seu desempenho acadêmico piorou muito desde o início dos sintomas.

Qual o diagnóstico mais provável?

- A) Esquizofrenia
- B) Transtorno de ansiedade social
- C) Transtorno obsessivo compulsivo
- D) Transtorno de ansiedade generalizada
- E) Transtorno do pânico

12. No caso anterior, qual o tratamento psicoterápico mais indicado?

-
- A) Psicoterapia de orientação analítica
 - B) Psicoterapia breve
 - C) Psicoterapia de apoio
 - D) Terapia cognitivo-comportamental
 - E) Psicanálise

13. Considere as seguintes assertivas sobre a teoria das relações de objeto. Marque V, se verdadeiro, e F, se falso.

- () Na posição esquizo-paranoide, a ansiedade é persecutória, e há a projeção da pulsão de morte no objeto que será considerado mau e perseguidor.
- () A ansiedade da perda de amor do objeto ocorre na posição depressiva, envolvendo o processo de culpa e reparação.
- () A cisão entre seio bom e seio mau é o principal mecanismo de defesa que ocorre na latência.

A sequência correta é:

- A) F, F, V.
- B) F, V, V.
- C) V, V, F.
- D) V, F, V.
- E) V, V, V.

14. Por Superego, entendemos:

- A) Forças impulsivas da mente
- B) Conciliação entre os impulsos instintivos e aceitação moral
- C) Características centrais da personalidade
- D) Sentimentos inflados de autoestima
- E) Estrutura mental relacionada à moral

5

15. No transtorno de estresse pós-traumático, é comum as pessoas passarem a evitar estímulos ameaçadores. Quando, ao remover um estímulo aversivo (ameaça), aumenta a probabilidade do comportamento precedente (evitação), ocorre:

- A) Reforço positivo.
- B) Reforço negativo.
- C) Catastrofização.
- D) Simbolização.
- E) Aprendizagem social.

16. Sobre o desenvolvimento psicosssexual segundo Freud, relacione a primeira coluna com a segunda:

- a. Fase oral
- b. Fase anal
- c. Fase fálica
- d. Latência

- () A fixação nesta fase está relacionada às personalidades obsessivas, perfeccionistas, meticulosas e avarentas.
- () Fase na qual as pulsões são reprimidas e deslocadas para atividades escolares, esportes e

atividades com outras crianças.

- () No complexo de Édipo, a criança se volta para o progenitor do sexo oposto, e apresenta sentimentos de hostilidade com relação ao progenitor do mesmo sexo.
() Experiências de gratificação e frustração com relação à figura materna dão origem ao ego.

A sequência CORRETA é:

- A) a - b - c - d
B) b - d - c - a
C) b - c - d - a
D) c - d - a - b
E) d - b - c - a

17. A terapia de exposição, técnica comportamental na qual o paciente é progressivamente exposto à situação temida, tendo como consequência a extinção do condicionamento na ausência de reforço, é INDICADA no/a:

- A) Transtorno do pânico
B) Depressão maior
C) Transtorno psicótico
D) Transtorno de personalidade dependente
E) Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade

18. São contraindicações da terapia comportamental, EXCETO:

- A) Ausência de motivação
B) Transtorno de ansiedade grave
C) Deficiência intelectual leve
D) Psicopatia
E) Episódio maníaco

6

19. Com relação aos transtornos fóbico-ansiosos, é CORRETO afirmar:

- A) Pessoas com fobias específicas raramente apresentam outros transtornos mentais.
B) Inibição comportamental e neuroticismo estão intimamente associados aos transtornos de ansiedade.
C) Entre esses transtornos, a agorafobia é a que apresenta menor herdabilidade.
D) O abuso ou dependência de cocaína ocorre com frequência em pacientes com transtorno de pânico.
E) Os indivíduos com transtorno de ansiedade social com frequência subestimam as consequências negativas das situações sociais.

20. Considere as assertivas abaixo:

- I- Diversos transtornos de personalidade podem cursar com ausência ou diminuição de empatia, tais como o Transtorno de Personalidade Antissocial, o Transtorno de Personalidade Borderline e o Transtorno de Personalidade Narcisista.
II- O tratamento baseado em evidências para o Transtorno de Personalidade Antissocial é feito com Psicoterapia de Orientação Analítica.
III- O diagnóstico de Transtorno de Personalidade Antissocial pode ser dado a partir dos treze anos de idade.

Está(ão)CORRETA(S):

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) I e II, apenas.
- E) Todas.